




図 3.3.49 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (130°E)




図 3.3.50 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (140°E)




図 3.3.51 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (150°E)




図 3.3.52 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (160°E)




図 3.3.53 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (170°E)




図 3.3.54 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (180°)




図 3.3.55 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (170°W)




図 3.3.56 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (160°W)




図 3.3.57 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (150°W)




図 3.3.58 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (140°W)




図 3.3.59 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (130°W)




図 3.3.60 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (120°W)




図 3.3.61 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (110°W)




図 3.3.62 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (100°W)




図 3.3.63 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (90°W)




図 3.3.64 秋季におけるポテンシャル密度の南北断面分布 (80°W)