



東京工業大学
Tokyo Institute of Technology



北海道大学
HOKKAIDO UNIVERSITY

2021年5月6日



国立極地研究所
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構



MAKE NEW STANDARDS.
東海国立
大学機構



名古屋大学

東京工業大学

北海道大学

情報・システム研究機構 国立極地研究所

名古屋大学

気象研究所



気象研究所
Meteorological Research Institute

SO₂ 排出削減にもかかわらず硫酸エアロゾル減少が鈍化する 要因を特定

—硫酸の三酸素同位体組成に基づいたフィードバック機構の解明—

【要点】

- 1980 年以降の二酸化硫黄排出規制にもかかわらず、硫酸エアロゾルの減少が鈍化しているメカニズムを解明
- アンモニアなどのアルカリ性物質の増加による大気酸性度低下が原因で、大気化学過程が変化し、結果的に硫酸生成効率が上昇
- 大気汚染の効果的な防止策や気候変動の正確な予測には、大気化学反応のフィードバック機構を考慮したモデルが必要

【概要】

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系の服部祥平助教らを中心とする東京工業大学、北海道大学、国立極地研究所、名古屋大学、気象研究所などの研究グループは、北極グリーンランドアイスコア（用語 1）の分析から硫酸エアロゾルの生成過程を復元し、1980 年以降の二酸化硫黄（SO₂）排出削減にもかかわらず、硫酸エアロゾルの減少が鈍化している要因を解明した。

大気中で SO₂ から生成される硫酸エアロゾルは、気候変動や健康影響との関連から重要な物質とされている。SO₂ 排出量は排出規制の導入により、1980 年以降の 30 年間で約 7 割削減されたものの、硫酸エアロゾルの減少は 5 割程度にとどまっている。この減少鈍化のメカニズムが特定されていないことが、効果的な削減策の策定や正確な気候変動予測の足かせとなってきた。

本研究では、北極グリーンランドアイスコア試料を使った硫酸の三酸素同位体組成（ $\Delta^{17}\text{O}$ 値）（¹⁷O の異常濃縮、用語 2）の分析により過去 60 年間の大気中の硫酸エアロゾルの生成過程を復元した。その結果、この期間に大気中の酸性度が減少したため、排出された SO₂ から硫酸への酸化反応が促進される「フィードバック機構」が作用していたことがわかった。酸性度の減少は、SO₂ 削減による酸性物質の減少に加え、施肥などによるアンモニアなどのアルカリ性物質の排出増加によると考えられる。規制対象ではなかったアルカリ性物質の排出が、硫酸エ

エアロゾルの減少鈍化の原因であったという本研究の結果は、今後の効果的な大気汚染の緩和策の策定や、正しい将来の気候変動予測に役立つことが期待される。

本研究成果は、5月5日（米国東部時間）にアメリカ科学振興会（AAAS）のオンライン誌「サイエンスアドバンシズ（*Science Advances*）」に掲載された。

●背景

大気微粒子（エアロゾル）は、大きな粒子になると雲の核として作用し、雲粒数を増やす効果があり、結果として雲が日射を遮るため、地球表面を寒冷化する要因となる。また直径 $2.5 \mu\text{m}$ 以下のエアロゾル（PM_{2.5}）は人体に悪影響を及ぼすことが知られている。二酸化硫黄（SO₂）が大気中で酸化されて生成する硫酸（SO₄²⁻）エアロゾルは、大気エアロゾルの主成分であり、その動態の理解は、上述した気候影響と健康影響の両面に関連するため重要とされている。

産業革命以後、北半球では人間活動（化石燃料の使用）の増加によって大気中の SO₂ 濃度が上昇し、それに伴って硫酸エアロゾルが増加した。これにより、1970年代や80年代には世界的に環境汚染が顕在化し、国内でも公害問題などでその問題が認識されるようになった。米国では、1970年、1977年、1990年に改訂された大気浄化法（Clean Air Act）によって SO₂ の排出が規制されたことにより、1980年以降は SO₂ 濃度が減少している。

この SO₂ 排出規制によりエアロゾルが減少したことで、米国だけで数十万人の命が救われたという報告（Cohen et al. 2017）がある一方で、1980年代以降の硫酸エアロゾルの減少は SO₂ に比べて緩やかであり、排出規制が効果的に作用していないことが指摘されている。このような硫酸エアロゾル減少の”鈍化”を説明するメカニズムとして、大気環境の変化によって従来と異なる化学反応が促進されるようになり、SO₂ が大気中で硫酸（SO₄²⁻）へ酸化される効率が上がるという、「フィードバック機構」がいくつか提案されてきた。しかし、提案されたような大気化学反応過程の変化を実証する観測的証拠は、これまで存在しなかった。

●研究の経緯

本研究では、北半球における SO₂ の排出規制前と後の時代について、大気中の SO₄²⁻ の化学反応過程に変化があったかどうかを復元した。その方法は、過去のエアロゾルを保存しているアイスコア内の SO₄²⁻ の三酸素同位体組成（ $\Delta^{17}\text{O}$ 値）を調べるというものである。大気中の SO₄²⁻ は硫黄原子 1 個と酸素原子 4 個とからなる化合物だが、このうち酸素原子の同位体比が大気化学反応過程を知る手がかりになる。具体的には、 $\Delta^{17}\text{O}$ 値を調べることにより、オゾン（O₃）が関与した酸化剤（O₃, H₂O₂ 等, $\Delta^{17}\text{O} > 0 \text{ ‰}$ ）による大気酸化反応（図 1 の R2 と R3）と、それ以外の酸化剤（OH 等, $\Delta^{17}\text{O} \simeq 0 \text{ ‰}$ ）による大気酸化反応（図 1 の R1 と R4）を区別できる。この手法を、過去 60 年間の北米及び西ヨーロッパの大気エアロゾルを保存している、グリーンランド南東ドームコア（SE-Dome コア、図 2）で掘

削されたアイスコアに適用した。




図 1. 硫酸生成過程とその三酸素同位体組成 ($\Delta^{17}\text{O}$ 値)




図 2. アイスコア掘削地点と現地の写真 (左図赤丸が SE-Dome 掘削地点)

●研究成果

研究成果 1 過去 60 年間で硫酸 (SO_4^{2-}) エアロゾルの生成過程が変化していた
 分析の結果、過去 60 年間で SO_4^{2-} の $\Delta^{17}\text{O}$ 値が 1.0 ‰から 1.7 ‰に上昇したことが確認された (図 3)。この SO_4^{2-} の $\Delta^{17}\text{O}$ 値の上昇は、 SO_2 の液相 O_3 酸化 (図 1 の R2 反応、 $\Delta^{17}\text{O}$ 値が 6.4 ‰と高い) の寄与率が 10~15 ‰ほど高まっていることを示している。このことから、この期間に大気中での SO_4^{2-} 生成過程が変化したことが明らかになった。R2 反応は、大気中の酸性度が低い (アルカリ性度が高い = 液相の pH が高い) ほど反応速度が速いことが知られている。実際に、1980 年代以降の SO_2 排出量の削減によって、大気中の酸性物質の濃度は低下してきたのに対し、アンモニア (NH_3) などのアルカリ性物質の濃度は逆に増加しており、大気中の酸性度は低下傾向 (液相の pH は上昇傾向) にある。すなわち、R2 反応が起きやすくなる環境が生じ、 SO_4^{2-} 生成効率が高まっていると考えられる。




図 3. 過去 60 年間の $\Delta^{17}\text{O}$ 値の変遷。1975 年以降に $\Delta^{17}\text{O}$ 値が上昇傾向にある。

研究成果 2 硫酸 (SO_4^{2-}) 生成効率の上昇が数値計算でも確認された

さらに本研究では、全球大気化学輸送モデル (GEOS-Chem) を用いて、大気中での SO_4^{2-} 生成効率を生成過程ごとに評価した (図 4)。その結果、北米と西ヨーロッパの両方で、1973 年から 2013 年にかけて SO_4^{2-} 生成効率が 10~15% 上昇し、その要因として R2 反応の寄与増大が関わっていることが、数値計算からも確認できた。また、北米とヨーロッパで SO_4^{2-} 生成効率に寄与する硫酸生成過程の割合が異なることから、大気化学反応や SO_4^{2-} 生成効率には地域差が見られ、効果的な削減達成には地域の状況に沿った排出規制策が必要であることも明らかとなった。




図 4. 全球大気化学輸送モデルによる SO_4^{2-} 生成効率(棒グラフ)の変化(A: 北米、B: 西ヨーロッパ)。 SO_4^{2-} 生成効率は SO_4^{2-} 生成量 ($P(\text{SO}_4^{2-})$: 赤線) と、存在していた SO_2 量 ($S(\text{SO}_2)$: 黒線) から算出。

● まとめと今後の展開

本研究では、アイスコアの SO_4^{2-} の $\Delta^{17}\text{O}$ 値から、過去 60 年間に大気中での硫酸エアロゾル生成反応が変化している証拠を発見した (図 5)。このことから、硫酸エアロゾルがもたらす大気汚染の防止や気候変動の予測には、 SO_2 の排出量削減だけでなく、硫酸生成反応の効率に関わるアンモニアの管理も重要であること

が示唆される。このため、 SO_2 などの単一の汚染物質の排出規制だけでなく、大気化学過程に関連する複数の要素を考慮した、効率的な排出規制策を策定することが必要と考えられる。

この知見は、大気汚染問題の解決に向けた排出規制の実施・検証がこれから行われる、中国やインドなどの地域での現象解明に貢献することも期待される。さらに、人為活動の変化によって、エアロゾルの動態やその気候影響がどのように変化するかを予測するのにも役立つと期待される。

北海道大学の飯塚准教授らの研究グループは、今回対象とした SE-Dome 域において第二期アイスコア掘削計画を実施している。この第二期では、産業革命前から現在にかけての人間活動の変化に対応するエアロゾル生成・動態の復元に取り組み、過去 200 年間のエアロゾルについての世界で最も確度の高いデータベースの公開を目指している。




図 5. 本研究で明らかとなった SO_4^{2-} 生成過程の変化メカニズム。 SO_2 削減による酸性物質の減少に対し、アンモニアなどのアルカリ性物質の増加によって、大気の酸性度が変化したことで、 SO_2 から硫酸への酸化反応が促進された。赤矢印は促進されたプロセスを示す。

【付記】

本研究は下記の日本学術振興会（JSPS）科学研究費助成制度及びその他の研究費の支援により実施された。

- 研究費名：基盤研究 B（20H01975）2020～2022 年度
研究課題名：硫酸の三酸素同位体組成に基づくケミカルフィードバック機構の要因解明と将来予測（代表 服部 祥平（東京工業大学））
- 研究費名：若手研究 A（16H05884）2016～2019 年度

研究課題名：氷床コア中の硫酸・硝酸の三酸素同位体組成を用いた過去 80 年間の大気酸化力の復元（代表 服部 祥平（東京工業大学））

- 研究費名：基盤研究 S（18H05292）2018～2022 年度
研究課題名：世界一の確度をもつ過去 200 年間の沈着エアロゾルのデータベース創成と変遷解明（代表 飯塚 芳徳（北海道大学））
- 研究費名：基盤研究 S（17H06195）2017～2021 年度
研究課題名：アイソトポログによる地球表層環境診断（代表 吉田 尚弘（東京工業大学））
- 研究費名：基盤研究 B（18H03363）2018～2021 年度
研究課題名：地球システムモデルの高度化と北極域における黒色炭素粒子の気候影響評価（代表 大島 長（気象庁気象研究所））
- 研究費名：北海道大学 低温科学研究所 共同研究プログラム
- 研究費名：ArCS II（北極域研究加速プロジェクト） JPMXD1420318865

【用語説明】

- (1) **アイスコア**：氷床コアとも呼ばれ、氷河や氷床から取り出された氷の試料のことを指す。一般に地下に向かうにつれて古くなるため、古気候や古環境の研究に用いられる。本研究では、北海道大学低温科学研究所の飯塚芳徳准教授及び的場澄人助教らが 2015 年に掘削したグリーンランド南東ドームコア（SE-Dome コア）を用いた。このアイスコアは、過去 60 年間の北米と西ヨーロッパを主な起源とする人為由来エアロゾルの歴史を、世界中のアイスコアの中で最高の年代精度で保存している。
- (2) **$\Delta^{17}\text{O}$ 値**：酸素安定同位体組成は一般的に、最も存在量の多い ^{16}O に対する ^{17}O 、 ^{18}O の比率を $\delta^{17,18}\text{O}$ 値 ($=^{17,18}\text{O}/^{16}\text{O} - 1$) と定義して評価する。さらに大気中のオゾンのように特異的な ^{17}O の濃縮は、質量依存則 ($\delta^{17}\text{O} = 0.52 \times \delta^{18}\text{O}$) からのずれとして評価するため、 $\Delta^{17}\text{O} = \delta^{17}\text{O} - 0.52 \times \delta^{18}\text{O}$ と定義されている。大気中のオゾン (O_3) は生成時に ^{17}O を特異的に濃縮し、 O_3 は $\Delta^{17}\text{O} =$ 約 25 ‰ という特徴的な値を有する。他方、 O_2 や H_2O は ^{17}O を異常濃縮せず、 $\Delta^{17}\text{O} = 0$ ‰ である。

【論文情報】

掲載誌：*Science Advances*

論文タイトル：Isotopic evidence for acidity-driven enhancement of sulfate formation after SO_2 emission control

著者：服部祥平（東京工業大学 物質理工学院応用化学系 助教）

飯塚芳徳（北海道大学 低温科学研究所 准教授）

Becky Alexander（ワシントン大学 大気科学科 教授）

石野咲子 (国立極地研究所 日本学術振興会特別研究員 PD)
藤田耕史 (名古屋大学 環境学研究科 教授)
Shuting Zhai (ワシントン大学 大気科学科 博士課程学生)
Tomás Sherwen (ヨーク大学 研究員)
大島長 (気象庁気象研究所 主任研究官)
植村立 (名古屋大学 環境学研究科 准教授)
山田明憲 (豊島電気製作所)
の場澄人 (北海道大学 低温科学研究所 助教)
鈴木希実 (東京工業大学 物質理工学院応用化学系 研究員 (研究当時))
鶴田明日香 (東京工業大学 物質理工学院応用化学系 修士課程学生 (研究当時))
Joel Savarino (グルノーブルアルプス大学 主任研究員)
吉田尚弘 (東京工業大学 物質理工学院 教授 (研究当時)、地球生命研究所 特任教授)

掲載巻・号・年 : Vol. 7, Issue 19, 2021

DOI : 10.1126/sciadv.abd4610

【問い合わせ先】

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 助教
服部祥平

E-mail: hattori.s.ab@m.titech.ac.jp

TEL: 045-924-5416 もしくは 045-924-5506

FAX: 045-924-5413

【取材申し込み先】

東京工業大学 総務部 広報課

E-mail: media@jim.titech.ac.jp

TEL: 03-5734-2975

FAX: 03-5734-3661